Actualités Herbicides et Insecticides

Journée d'Information Technique – Céréales et Protéagineux

Charlène Buridant

11 mars 2020

Actualités herbicides/insecticides Céréales

Retrait herbicides

- **ARDEUR -**
  - Composition : metsulfuron-methyl 200g/kg
  - Dose : 0,03 kg/ha
  - Retrait AMM : 30/10/2019
  - Fin de distribution : 30/04/2020
  - Arrêt d'utilisation : 30/04/2021
  - Usages concernés : Blés, orges, seigle

Modification herbicides

- **PICOSOLO - *BASF* :**
  - Nouvel usage : Epeautre
  - Perte de l'usage : Orge de printemps
  - Composition : picolinafen 750 g/kg
  - Dose : 133 g/ha, prélevée à fin tallage
  - Cultures : BH, OH, triticale et épeautre
- **ALLIE STAR SX - *FMC* :**
  - Diminution dose : Automne
  - Composition : metsulfuron-methyl 111 g/kg + tribénuron- methyl 222 g/kg
  - Dose et usages : 1 application maxi/an
    - Sur cultures d'hiver (Avoine, Orge, Blés et seigle) :
      - 0,027 kg/ha avant repos végétatif, de 2 feuilles à avant tallage
      - 0,045 kg/ha en reprise de végétation, de début tallage à DFE
    - Sur cultures de printemps (Avoine, Orge et Blés)
      - 0,045 kg/ha, de 2 feuilles à DFE

Modification herbicides

- **SIMPLON - *FMC* :**
  - Diminution dose : Automne
  - Composition : metsulfuron-methyl 200 g/kg
  - Dose et usages : 1 application maxi/an, sauf si application avant début tallage, 1 application maxi tous les 2 ans
    - Sur cultures d'hiver (Orge, Blés et seigle) :
      - 0,015 kg/ha avant repos végétatif, de 3 feuilles à avant tallage
      - 0,025 kg/ha en reprise de végétation, de début tallage à DFE
    - Sur cultures de printemps (Orge et Blés)
      - 0,030 kg/ha, de 3 feuilles à DFE

Nouveautés herbicides

- **FOX - *ADAMA*** *(AD : jonc des crapauds, lamiers, mercuriales, véronique, …)*
  - Composition : bifenox 480 g/l
  - Dose : 1,5 l/ha
  - Stades : 2 feuilles à 2 nœuds
  - Cultures : Blés, orges, avoine et seigle
  - Restriction drainage : Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés.
- **SARACEN DELTA – *NUFARM*** *(AD : bleuet, capselle, coquelicot, gaillet, pensées, …)*
  - Composition : florasulam 50 g/l + diflufenican 500 g/l
  - Usages :
    - BH, OH, épeautre et seigle : 1 application maxi
      - Automne : 0,075 l/ha de 2 feuilles à 2 talles
      - Reprise de végétation : 0,1 l/ha de début à fin tallage
    - BP et OP : 0,1 l/ha de 2 feuilles à fin tallage

Nouveautés herbicides

- **XINIA - *BAYER***

(AG : pâturins, jonc des crapauds, vulpin, ray-grass / AD :coquelicot, gaillet, géranium, matricaire, …)

  - **Composition :** flufenacet 171 g/l + diflufenican 171 g/l + metribuzin 64 g/l
  - **Dose :** 0,7 l/ha
  - **Stades :** 1 à 3 feuilles
  - **Cultures :** BTH, BDH, OH et triticale
  - **Restriction drainage :** Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés.

- **MATENO - *BAYER***

(AG : agrostis, jonc des crapauds, pâturins, vulpin, ray-grass/AD : bleuet, coquelicot, géranium, matricaire, ….)

  - **Composition :** flufenacet 75 g/l + diflufenican 60 g/l + aclonifen 450 g/l
  - **Dose :** 2 l/ha
  - **Stades :** prélevée ou 1 à 3 feuilles
  - **Cultures :** BTH
  - **Restriction drainage :** Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés.

Nouveautés herbicides

- **QUIRINUS - *BAYER***

(AG : pâturins, vulpin, ray-grass / AD : coquelicot, gaillet, mourons, pensées, véroniques, …)

- **Composition :** flufenacet 240 g/l + picolinafen 50 g/l
- **Dose :** 1 l/ha
- **Stades :** prélevée à fin tallage
- **Cultures :** BTH, BDH, OH et seigle

Nouveautés herbicides

- **GLOSSET 600 SC – *BELCHIM***

(AG : vulpin, ray-grass, agrostis, pâturins, vulpie / AD : sanve, ravenelle, capselle, mouron, stellaire, …)

  - Composition : flufenacet 600 g/l
  - Dose : 0,3 l/ha (BDH), 0,4l/ha (BTH, OH, seigle)
  - Stades : 1 à 3 feuilles
  - Cultures : BTH, BDH, OH et seigle
  - Restriction drainage : Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés.

- **SUNFIRE – *CERTIS***

(AG : vulpin, ray-grass, agrostis, pâturins, vulpie / AD : gaillet, coquelicot, matricaire, stellaire, …)

  - Composition : flufenacet 500 g/l
  - Dose : 0,36 l/ha (BDH), 0,48 l/ha (BTH, OH, seigle)
  - Stades : prélevée à 3 feuilles
  - Cultures : BTH, BDH, OH et seigle
  - Restriction drainage : Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés

Nouveautés insecticides

- **MAVRIK JET – *ADAMA***
  - Composition : pirimicarbe 50 g/l + tau-fluvalinate 18 g/l
  - Dose : 2 l/ha
  - Usages :
    - Céréales d'hiver : mouches et pucerons :
      - 1 application maxi, de début épiaison à grain mi-laiteux
    - Céréales de printemps : mouches et pucerons
      - 2 applications maxi, de début épiaison à grain mi- laiteux

MENTION ABEILLE
Fleurs et exsudats

Actualités herbicides/insecticides Protéagineux

Retrait herbicides

- **LEOPARD 120**
  - Composition : quizalofop-P-ethyl 120 g/l
  - Dose : 1,25 l/ha (1 application maxi)
  - Retrait AMM : 26/09/2019
  - Fin de distribution : 26/03/2020
  - Arrêt d'utilisation : 26/03/2021

Nouveautés insecticides

- **MAVRIK JET – *ADAMA***
  - Composition : pirimicarbe 50 g/l + tau-fluvalinate 18 g/l
  - Dose : 2,4 l/ha
  - Usages :
    - Féveroles et lupins → pucerons :
      - 1 application maxi, de 2 feuilles à grains complétement formés
    - Pois protéagineux et fourrager → pucerons
      - 1 application maxi, de 2 feuilles à 50% de gousses mûres
  - Restrictions : Sol drainés
    Ne pas appliquer à l'automne

MENTION ABEILLE

Fleurs et exsudats