

## **THEME & MOTS CLEFS (BdD) :**

Ravageurs, mouche de la carotte

## **REFERENCE DE L'ARTICLE**

Type	Support	Année	Auteur	Titre	Référence
Com	Numérique	2012	Villeneuve F.	Connaissance et maîtrise de la mouche de la carotte	Le point sur les maladies et les ravageurs, CTIFL, mars 2012, N°3

## **MOTS CLEFS**

Méthode de lutte, carotte consommation

## **RESUME**

La carotte perd très vite de sa valeur dès la présence de la larve de la mouche de la carotte. D'autres ravageurs font des dégâts similaires, attention à bien les identifier. Les adultes émergent au printemps. En condition favorables il peut y avoir jusqu'à deux générations par an, les premières larves apparaissent mi-mai. La mouche de la carotte possède un corps noir, des pattes jaunes et une tête rougeâtre. Une femelle peut pondre jusqu'à 120 œufs, ceux-ci sont blancs. Elle hiverne sous forme de pupes. L'augmentation de la pression se fait par la proximité de haies autour des parcelles. Le piégeage des mouches permet d'obtenir des courbes de vol. Pour lutter contre la mouche de la carotte il reste une substance active utilisable, des modèles de prévision existent. Différentes techniques existent pour réduire la pression mais elles ne permettent pas d'éliminer le ravageur.

## **CITATIONS / DEFINITION**

## **COMMENTAIRES PERSONNELS**